

VARIEDADES SOJA

RA



Rojas

Díaz

Villa Aranguren

General Galarza

San Justo

Avellaneda

La ruta hacia el Alto Rendimiento<sup>(RA)</sup>





|  | RA 349   | RA 437   | <b>NUEVA</b><br>RA 4458*   | RA 550  | RA 5715<br>IPRO  | <b>NUEVA</b><br>RA 5816*  | RA 549  | <b>NUEVA</b><br>RA 569*   | RA 652  | <b>NUEVA</b><br>RA 655                                  | RA 6615<br>IPRO   | RA 659   | RA 750                                      | RA 844   |
|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| Atributo destacado   | Plasticidad  | Estabilidad  | Rendimiento  | Plasticidad + Estabilidad   | Rendimiento  | Rendimiento + Estabilidad                                       | + Estabilidad Rendimiento                                       | Rendimiento   | Plasticidad   | Rendimiento   | Estabilidad   | Plasticidad  | Rendimiento                                 | Estabilidad  |
| Grupo de madurez<br>Ciclo<br>Hábito de crecimiento<br>Tipo de hoja   | III Largo<br><b>3,8</b><br>indeterminado<br>oblonga  | IV (Largo)<br><b>4,7</b><br>indeterminado<br>oblonga   | IV (Largo)<br><b>4,8</b><br>indeterminado<br>oval                              | V (Corto)<br><b>5,3</b><br>indeterminado<br>oval                                    | V (Largo)<br><b>5,7</b><br>indeterminado<br>oval                           | V Largo<br><b>5,8</b><br>indeterminado<br>lanceolada            | V (Largo)<br><b>5,9</b><br>indeterminado<br>oblonga             | V Largo<br><b>5,9</b><br>indeterminado<br>oblonga               | VI (Corto)<br><b>6,2</b><br>indeterminado<br>oval                   | VI (Medio)<br><b>6,5</b><br>indeterminado<br>lanceolada | VI (Medio)<br><b>6,5</b><br>indeterminado<br>oval                 | VI (Largo)<br><b>6,9</b><br>indeterminado<br>oval  | VII<br><b>7,0</b><br>determinado<br>oval    | VIII<br><b>8,3</b><br>indeterminado<br>oval              |
| Color de hilo<br>Color de pubescencia<br>Color de flor   | negro<br>castaño<br>blanca   | negro<br>castaño<br>púrpura  | negro<br>castaño<br>blanca   | negro<br>castaño oscuro<br>púrpura  | negro imperfecto<br>gris<br>púrpura  | negro<br>castaño<br>púrpura                                     | castaño claro<br>gris<br>blanca                                 | negro imperfecto<br>gris<br>púrpura                             | castaño claro<br>gris<br>blanca                                     | castaño oscuro<br>castaño oscuro<br>púrpura             | castaño intermedio<br>gris<br>púrpura                             | castaño<br>gris<br>blanca  | negro imperfecto<br>gris<br>púrpura         | negro<br>castaño<br>púrpura                              |
| Peso de 1.000 semillas (A)*  | <b>176 grs</b>   | <b>188 grs</b>   | <b>168 grs</b>   | <b>180 grs</b>  | <b>162 grs</b>   | <b>178 grs</b>  | <b>158 grs</b>  | <b>175 grs</b>  | <b>146 grs</b>  | <b>167 grs</b>  | <b>176 grs</b>  | <b>156 grs</b>   | <b>156 grs</b>                              | <b>161 grs</b>   |
| Días a R1 (B)*<br>Días a R8 (C)*   | 39<br>134  | 45<br>139  | 46<br>146  | 50<br>150   | 67<br>156  | 59<br>156   | 59<br>157   | 59<br>158   | 62<br>160   | 61<br>162   | 64<br>163   | 68<br>168  | 70<br>170                                   | 77<br>179  |
| Altura (D)*<br>Potencial de ramificación<br>Tipo de ramificación   | 93 cm<br>alto<br>abierta   | 90 cm<br>alto<br>abierta   | 72 cm<br>alto<br>abierta   | 98 cm<br>alto<br>abierta  | 105 cm<br>media<br>cerrada   | 98 cm<br>alto<br>abierta  | 102 cm<br>alto<br>abierta                                       | 92 cm<br>alto<br>abierta  | 108 cm<br>alto<br>abierta   | 101 cm<br>alto<br>abierta                               | 103 cm<br>media<br>cerrada  | 115 cm<br>alto<br>abierta  | 92 cm<br>alto<br>abierta                    | 120<br>alto<br>abierta                                   |
| <b>Comportamiento sanitario</b><br>Cancro del tallo <sup>1</sup><br>Phytophthora sojae <sup>2</sup><br>Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | R<br>R (Rz 3, 17)<br>MS  | R<br>R (Rz 1, 3, 4, 17, 25)<br>MS  | R<br>S<br>S  | R<br>R (Rz 1)<br>S  | R<br>R (Rz 1, 3, 17)<br>S  | R<br>S (Rz 1, 2 y 4)<br>S/d                                     | R<br>R (Rz 1, 3)<br>S   | R<br>R (Rz 1, 3 y 4)<br>S/d                                     | R<br>S<br>S   | R<br>S<br>S   | R<br>R (Rz 1, 3, 17)<br>S   | R<br>S<br>S  | R<br>R (Rz 1, 17)<br>s/d                    | R<br>S<br>R  |
| <b>Zona recomendada</b>  | Zona núcleo. Oeste, centro y sur de Buenos Aires. Noreste de La Pampa. Centro-sur de Córdoba. Sur de Entre Ríos. | Zona núcleo y centro de Buenos Aires. Noreste de La Pampa. Centro-Sur de Santa Fe y Córdoba. | Zona núcleo. Centro y sur de Santa Fe y Córdoba. Centro y sur de Buenos Aires. | Centro-sur de Santa Fe y Córdoba. Norte y oeste de Buenos Aires. Sur de Entre Ríos. | Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. NOA y NEA. | Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. | Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. | Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. | Centro y norte de Santa Fe, norte de Córdoba y Entre Ríos. NOA-NEA. | Región centro y litoral. NOA-NEA                        | Centro-norte de Santa Fe, Norte de Córdoba y Entre Ríos. NOA-NEA. | Centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos. NEA-NOA. Recomendada para pastoreo-forrajera en zona Núcleo. | Centro-norte de Santa Fe y Corrientes. NOA. | NOA y NEA. Norte de Santa Fe. Recomendada para pastoreo. |



La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los Departamentos de Investigación y Desarrollo de Santa Rosa Semillas, en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima.

Datos variables con el ambiente. \* Peso de 1000 semillas grs (A)\*/ Altura en cm (D)\*; Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)\*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)\*: datos tomados en Salto.

\* En trámite de inscripción en INASE. - Comportamiento sanitario:1 Diaporthe phaseolorum var. Meriodinalis - 2 Phytophthora Sojae - 3 Cercospora Sojina - Referencias: s/d: sin dato / R: resistente / MR: moderadamente resistente / MS: moderadamente susceptible / S: susceptible



Todas las variedades del catálogo se comercializan bajo el sistema de regalía extendida.

INTACTA RR2 PRO

INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo es una marca registrada de Monsanto Technology LLC.

**Altec** Bio  
Nutrición y Agrotecnología



Santa Rosa Semillas



Intellicrops Sements LTD



Genepar S.A.



Santa Rosa Semillas Uruguay



Santa Rosa Semillas Sudáfrica

Estamos en los principales mercados de América del Sur y África, ofreciendo los materiales más competitivos.



[www.santarosasemillas.com.ar](http://www.santarosasemillas.com.ar)



Coop. de Provisión de Serv. Agr. Criadero Santa Rosa Ltda.  
Paraguay 824, Piso 1 Of. 4 - 2000 Rosario, Santa Fe, Argentina  
[criadero@criaderosantarosa.com.ar](mailto:criadero@criaderosantarosa.com.ar)  
[www.santarosasemillas.com.ar](http://www.santarosasemillas.com.ar)